

各種ワクチン料金・注意事項

2022.04.15

- ・注射生ワクチンを接種した翌日以降に他の注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上空けて28日以降から接種可能（注射生ワクチン：麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチンなど）
- ・生ワクチンは、妊娠中及び妊娠の可能性のある方は接種出来ません。接種前1ヶ月及び接種後2ヶ月間は妊娠を避ける必要があります。
- ・複数回接種の場合、同一医療機関での接種をおすすめします。

ワクチン種類	ワクチン名称	価格 (税込1回)	成分	接種回数	1→2回目	2→3回目	抗体有効期間 の目安
麻疹・風疹2種混合(MR)	ミールビック	8,000	生	1			
流行性耳下腺炎(おたふく)	おたふくかぜ生ワクチン	5,500	生	1			
水痘(水ぼうそう)	乾燥弱毒性水痘ワクチン	6,500	生	1			
破傷風	破トキ	3,500	トキソイド	3	3~8週後	6~18ヵ月後	10年
A型肝炎	エイムゲン	8,500	不活化	3	2~4週後	20週後	3~5年
B型肝炎	ビームゲン	6,500	不活化	3	4週後	20~24週後	3~5年
日本脳炎	ジェービックV	5,500	不活化	3	2回目1~4週後、3回目1年後		4~5年
狂犬病	ラビピュール	15,000	不活化	3	1週後	3週後	2年
肺炎球菌	ニューモバックスNP	8,000	不活化		5年毎		5年
肺炎球菌	プレベナー	10,000	不活化	1			
インフルエンザ	インフルエンザHA	未定	不活化	1、2	(10~3月限定)		
ポリオ	イモバックス	9,000	不活化	4	20日以上→20日以上→6ヶ月以上		
4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風及びポリオ)		11,000	不活化	4	①②③の間は20日以上(20-56日)、③④の間は6か月以上(12-18か月)あける		